

Impfrichtlinie

Katzenpension Tiergarten Leipzig
Stand 01.01.2024

Präambel

Zum Schutz der abgegebenen Katzen, sowie der bereits in der Pension befindlichen Gäste, werden nur Katzen mit einem gültigen Impfschutz aufgenommen. Ein gültiger Impfschutz muss für die sog. Core-Impfungen bestehen, nämlich Katzenschnupfen und Katzenseuche (Katzenschnupfen (Felines Herpesvirus, Felines Calicivirus, RC), Katzenseuche (Panleukopenie, P)). Wir empfehlen darüber hinaus die Impfung gegen ebenfalls Katzenschnupfen auslösende Chlamydien deutlich (siehe S 2)
Sollte die Katze am Tag der Abgabe keinen gültigen (Core-) Impfschutz haben, können wird das Tier nicht aufnehmen. Der Halter hat in diesem Fall keinen Anspruch auf geleistete Anzahlungen gemäß unserer AGB.

Wichtig für den gültigen Impfschutz ist die richtige Durchführung der Grundimmunisierung.

“Als Grundimmunisierungen von Welpen gelten alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren.

Im Alter von

8 Lebenswochen: RCP

12 Lebenswochen: RCP

16 Lebenswochen: RCP

15 Lebensmonaten: RCP

Mütterliche Antikörper können durch Neutralisierung des verabreichten Antigens (Impfstoff) den Erfolg der Impfung empfindlich stören. Je höher die Spiegel dieser Antikörper sind, desto länger dauert es bis sie abgebaut sind, und umso länger ist die Periode, in der sie eine erfolgreiche Impfung verhindern. Da die Höhe dieser Antikörperspiegel in der Regel unbekannt ist, versucht man durch zusätzliche Impfungen während der kritischen Periode den optimalen Zeitpunkt zu treffen und den Impfling zu schützen. Eine Untersuchung zeigte, dass bei Katzenwelpen mütterliche Antikörper bis in die 20. Lebenswoche hinein vorhanden sind und die aktive Immunisierung in der 16. Lebenswoche verhindern können.

Bei Katzen **ab einem Alter von 20 Lebenswochen** ist für eine erfolgreiche Grundimmunisierung eine einmalige Impfung bei Verwendung von Lebendimpfstoffen und eine zweimalige Impfung bei inaktivierten Impfstoffen im Abstand von 3 bis 4 Wochen, gefolgt von einer weiteren Impfung nach 1 Jahr, bei beiden Varianten ausreichend.

Wiederholungsimpfungen

Wiederholungsimpfungen sind alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen.

RCP:

Nach erfolgreicher Grundimmunisierung werden Wiederholungsimpfungen im Abstand von bis zu drei Jahren empfohlen. " (StikoVet)

Dringend empfohlene Impfung:

Chlamydia felis

Bei *Chlamydia felis* (*C. felis*) handelt es sich ebenfalls um ein Bakterium, das **Katzenschnupfen** auslösen kann. Im Impfausweis erkennt man die Impfung gegen *C. felis* teilweise am Kürzel „**Ch**“. Diese Impfung muss **jährlich** aufgefrischt werden.

Der ideale Impfschutz lautet daher RCPCh, wobei der Bestandteil Ch jährlich aufgefrischt werden muss.

Empfohlene Impfungen

- Bordetella bronchiseptica
- Leukose (FeLV) - Nach vorherigen Antigentest und nur bis zum 6. Lebensjahr
 - Tollwut bei Freigängern