

WIE OFT WAS IMPFEN?

AUFSTELLUNG DER AUF DEM DEUTSCHEN MARKT ERHÄLTlichen IMPFSTOFFE FÜR KATZEN.

DAS PROBLEM.

Inzwischen sind 31 (!!) verschiedene Impfstoffe von verschiedenen Firmen auf dem deutschen Markt verfügbar. Die Verwirrung ist inzwischen nicht nur unter den Katzenbesitzern groß. Deshalb wollen wir an dieser Stelle aufzeigen, **wie oft welcher Impfstoff** laut Hersteller geimpft werden sollte.

Arnikastraße 2
D-85635 Höhenkirchen

TELEFON +49 8102 / 8 95 39 81
TELEFAX +49 8102 / 8 95 39 82

BITTE BEACHTEN:

Einige Impfstoffe sind sogenannte **Kombinations-Impfstoffe**. D.h. es werden verschiedene ImpfkompONENTEN mit einer Injektion gespritzt. Die Haltbarkeit des Schutzes ist aber bei den einzelnen Komponenten teilweise unterschiedlich!

Ottostraße 39
D-85521 Ottobrunn

TELEFON +49 89 / 418 742 90
TELEFAX +49 89 / 418 742 91
E-MAIL kontakt@dr-tier.de

FÜR DIE KATZ'

IMPFSTOFF	HERSTELLER	IMPFUNG GEGEN	GRUND-IMMUNISIERUNG	IMPF-RHYTHMUS
Enduracell T	Pfizer	Tollwut	1 Impfung	Alle 4 Jahre
Eurifel P	Merial	Seuche	< 12 Wochen: 2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen > 12 Wochen: 1 Impfung	Alle 2 Jahre
Eurifel RCPT	Merial	Seuche, Schnupfen, Tollwut	2. Impfung gegen Schnupfen, Seuche und Tollwut 1. Impfung gegen Schnupfen und Seuche	Jährlich
Felocell CVR	Elanco Animal Health	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Fevaxyn FeLV ¹	Pfizer	Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3 Wochen	Jährlich
Fevaxyn i-CHP ¹	Pfizer	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Fevaxyn i-CHP Chlam ¹	Pfizer	Seuche, Schnupfen, Chlamydien	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Fevaxyn Pentofel ¹	Pfizer	Seuche, Schnupfen, Chlamydien, Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Leucogen FeLV/RCP	Virbac	Seuche, Schnupfen, Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Leucogen	Virbac	Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Nobivac Bb	Intervet	Bordetellen	1 Impfung	Jährlich
Nobivac RC	Intervet	Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich

¹ Die Dauer des Impfschutzes ist nicht geklärt. ¹alle Komponenten sind inaktiviert.



WIE OFT WAS IMPFEN?

IMPFSTOFF	HERSTELLER	IMPfung GEGEN	GRUND- IMMUNISIERUNG	IMPF-RHYTHMUS
Nobivac RCP	Intervet	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Gegen Schnupfen jährlich, gegen Seuche alle 3 Jahre
Nobivac T	Intervet	Tollwut	1 Impfung	Alle 3 Jahre
Primucell FIP	Pfizer	FIP	2 Impfungen im Abstand von 3 Wochen	Jährlich ¹
Purevax FeLV	Merial	Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3-5 Wochen	Jährlich
Purevax RC	Merial	Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Purevax RCCh	Merial	Schnupfen, Chlamydien	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Purevax RCP	Merial	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach jährlich gegen Schnupfen und alle 3 Jahre gegen Seuche
Purevax RCPCh	Merial	Seuche, Schnupfen, Chlamydien	2 Impfungen im Abstand von 3 - 4 Wochen	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach jährlich gegen Schnupfen und Chlamydien, alle 3 Jahre gegen Seuche
Purevax RCPCh FeLV	Merial	Seuche, Schnupfen, Chlamydien, Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3 - 4 Wochen	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach jährlich gegen Schnupfen, Chlamydien und Leukose, alle 3 Jahre gegen Seuche
Rabdomun	Pfizer	Tollwut	1 Impfung	Alle 3 Jahre
Rabisin	Merial	Tollwut	1 Impfung	Alle 3 Jahre
Riemser Tollwut-Vakzine	Ecuphar	Tollwut	1 Impfung	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach alle 2 Jahre
Vanguard R	Pfizer	Tollwut	1 Impfung	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach alle 2 Jahre
Versifel CVR	Pfizer	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich
Versifel CVR-T	Pfizer	Seuche, Schnupfen, Tollwut	1. Impfung gegen Schnupfen und Seuche, 2. Impfung gegen Schnupfen, Seuche und Tollwut	Jährlich gegen Seuche und Schnupfen, alle 4 Jahre gegen Tollwut
Versifel FeLV	Pfizer	Leukose	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	1 Jahr nach Grundim- munisierung, danach alle 3 Jahre
Virbagen Tollwut-impfstoff	Virbac	Tollwut	1 Impfung	1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach alle 2-3 Jahre
Virbagen felis RC	Virbac	Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich

¹ Die Dauer des Impfschutzes ist nicht geklärt. ¹alle Komponenten sind inaktiviert.



WIE OFT WAS IMPFEN?

IMPfstoff	HERSTELLER	IMPfung GEGEN	GRUND- IMMUNISIERUNG	IMPf-RHYTHMUS
Virbagen felis RCP	Virbac	Seuche, Schnupfen	2 Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen	Jährlich gegen Schnupfen, alle 1-2 Jahre gegen Seuche
Virbagen felis RCP/T	Virbac	Seuche, Schnupfen, Tollwut	1. Impfung gegen Seuche und Schnupfen 2. Impfung gegen Seuche, Schnupfen und Tollwut	Jährlich gegen Schnupfen, alle 1-2 Jahre gegen Seuche, Tollwut 1 Jahr nach Grund- immunisierung, danach alle 2 Jahre

¹ Die Dauer des Impfschutzes ist nicht geklärt. ² alle Komponenten sind inaktiviert.

Hinweis zur Impfung gegen Katzenschnupfen: Alle Hersteller verwenden sowohl Felines Calicivirus (verschiedene Stämme) als auch Felines Herpesvirus (= Felines Rhinotracheitisvirus).

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Daten beruhen auf den Angaben der jeweiligen Hersteller. Der Autor übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben. Die jeweiligen Angaben des Herstellers sind zu beachten. Die Markennamen sind jeweils Eigentum der jeweiligen Herstellerfirmen. **Stand: 08.05.2012**

UNSERE IMPFEMPFEHLUNGEN.²

Pflichtimpfungen für alle Katzen (unabhängig von Alter, Haltung):

Impfungen gegen: **Katzenschnupfen**
Katzenseuche
Bei Freigängern: **Tollwut**
Feline Leukose

GRUNDIMMUNISIERUNG.

bei Katzen unter 12 Wochen.

Impfung in der/im

8. Lebenswoche: Schnupfen und Seuche (und Leukose)
12. Lebenswoche: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)
16. Lebenswoche: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)
15. Lebensmonat: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)

bei Katzen über 12 Wochen, die noch nie geimpft wurden.

Impfung in der/im

12. Lebenswoche: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)
16. Lebenswoche: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)
15. Lebensmonat: Schnupfen und Seuche (und Tollwut und Leukose)



WIE OFT WAS IMPFEN?

WIEDERHOLUNGSIMPFUNGEN.

Katzenschnupfen: jährlich

Katzen, die keinem hohen Infektionsdruck ausgesetzt sind
z.B. reine Wohnungskatzen, keine Tierpension, keine Ausstellung: **alle 2 Jahre**

Katzenseuche: alle 3 Jahre

Tollwut: alle 2 bis 4 Jahre (gemäß Angaben des Herstellers)

Felines Leukosevirus: zwischen 1 und 3 Jahre (gemäß Angaben des Herstellers)

OPTIONALE IMPFUNGEN.

Bordetella bronchiseptica:

für Katzen mit viel Kontakt zu Artgenossen (Tierpension, Tierheim, Katzenzuchten, Ausstellungen)
sollte **1 Woche vor der zu erwartenden Exposition geimpft werden.**

Impfschutz: 1 Jahr

Chlamydien:

zu empfehlen insbesondere bei Katzen in Katzenzuchten, Pensionen und Tierheimen³.

Impfschutz: 1 Jahr

Feline Infektiöse Peritonitis (FIP):

nur sinnvoll bei Tieren, welche bisher keinen Kontakt zu Coronaviren hatten und dementsprechend einen negativen FCoV-Titer haben. *Die Wirkung der Impfung ist bis heute nicht ausreichend belegt*⁴.

Impfschutz: keine Aussage möglich

DAS DR.TIER-FAZIT:

Nach Unmengen von Informationen kommen wir also zu dem Ergebnis, dass jede Katze regelmäßig gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft werden muss. Für Freigänger kommt noch die Tollwut- und Leukose-Impfung dazu. Hier unterscheiden sich jedoch unsere Empfehlungen von denen der Hersteller. **Empfohlen wird auch für die Tollwutimpfung eine mehrmalige Impfung während der Grundimmunisierung.** Die Hersteller hingegen sehen in ihren Impfprotokollen nur eine einmalige Impfung vor. Bei allen anderen Impfungen sollten Sie bei dem ganzen Wirr-Warr am besten zusammen mit Ihrem Tierarzt einen individuellen Impfplan für Ihre Mietze erstellen. Das kann sich lohnen.

Anmerkungen zur Impfung gegen das Feline Leukosevirus (FeLV):

Ein Impfschutz ist nur zu erwarten, wenn die Katzen FeLV-negativ sind. Sollte die Katze positiv sein, ist kein Impfschutz, aber auch keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Wir hoffen, etwas Licht in's Dunkel gebracht zu haben.

Doch noch Fragen? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per E-Mail an kontakt@dr-tier.de



Quellennachweis:

²in Anlehnung an: Ständige Impfkommission Vet. Im Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. – Leitlinie zur Impfung v. Kleintieren (09/2009)

³http://www.msdt-tiergesundheit.de/News/Fokusthemen/Chlamydieninfektion_Katze/Infektionsrisiko_Schutzmassnahmen.aspx, (08.05.12)

⁴http://www.med.vetmed.uni-muenchen.de/einrichtungen/gesundheitsvorsorge/leistungen/impfberatung/management_katze.pdf, (08.05.12)